

鄰近本校毒蛇血清配置醫療機構

醫院	地址	電話	血清種類	地理位置	備註
部立苗栗醫院	苗栗市為公路 747 號	037-261920	神經性 出血性 (請 40 分鐘內即送至醫院急救注射)		
大千綜合醫院	苗栗縣苗栗市恭敬路 36 號	037-357125	(在無法辨識毒蛇種類下，急診室會以毒蛇圖卡給予患者參考指認)		毒蛇血清來自「部立苗栗醫院」提供
頭份為恭紀念醫院	苗栗縣頭份鎮信義路 128 號	037-676811			毒蛇血清來自「部立苗栗醫院」提供

被蛇咬後的處置：

1. 在無法或尚未鑑定是否有毒的情況下，一律以毒蛇咬傷之急救準則處理。
2. 認清毒蛇形狀、大小、顏色及其他可能特徵。
3. 被毒蛇咬傷後，除雨傘節外，其他如百步蛇、龜殼花、眼鏡蛇、鎖鍊蛇及青竹絲等毒蛇，均會造成腫脹的現象；因此，應儘速將手上的戒指、手鐲、手錶和首飾等物品取下，以防止更大的傷害。
4. 儘速以彈性繃帶、絲襪或褲襪包緊患肢，包紮範圍越大越好。
5. 讓患者保持鎮靜，勿緊急跑動，勿因慌亂而延誤就醫時機，要記住「保持冷靜」是活命的唯一法則。
6. 切勿割開傷口，否則只會讓傷口更加惡化，甚至造成死亡。

7. 切勿喝酒，因為酒精會加速血液循環，使毒性更快發作。
8. 如果咬傷現場有冰塊，則可以衣物裹住冰塊再覆蓋於傷口，使傷口附近的血流速度減慢，而延緩毒素發作時間。
9. 儘速送醫接受診治並使用抗蛇毒血清治療。

抗蛇毒血清治療：

衛生署疾病管制局是國內唯一製造抗蛇毒血清的機構，目前生產抗蛇毒血清的種類計有：抗雨傘節及飯匙倩蛇毒混合血清、抗龜殼花及赤尾鮭蛇毒混合血清、抗百步蛇蛇毒血清、抗鎖鍊蛇蛇毒血清(執照申請中，尚未大量產製)等四種。一旦不幸被毒蛇咬傷後，儘快注射抗蛇毒血清是唯一有效的治療方法，然而即使在抗蛇毒血清注射後，一些腫脹、疼痛的臨床症狀仍免不了會出現，見下圖。



患者被龜殼花毒蛇咬傷，40 分鐘內連續施打**四劑抗蛇毒血清治療**，本圖為 72 小時後之照片，可見傷口附近紅腫且有發黑壞死的現象。



3 個月後，經植皮治癒後之照片。

一旦不幸被毒蛇咬傷時，千萬要保持鎮靜，不可慌張，並且儘量記住蛇的特徵，包括形狀、大小、顏色等，如此將有助於醫師及時施打正確的抗蛇毒血清，而增加活命的機會。以下謹提出「**四要、二不**」口訣，供參考並請牢記。**四要**：要「**看、脫、包、送**」。「**看**」：看清楚蛇的特徵，包括**形狀、大小、顏色**。「**脫**」：脫去戒指、手錶、手鐲。「**包**」：包紮傷口上緣。「**送**」：儘快送醫治療。**二不**：「**不切、不酒**」。「**不切**」：不要切割傷口。「**不酒**」：不要喝酒。