

## 國立聯合大學麻疹通報處理作業流程

105 年 2 月 1 日 製 定

- 一、麻疹好發於春夏二季，接獲通報麻疹確診個案通知。
- 二、健康中心現場接獲個案有發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽和口腔內頰側黏膜出現柯氏白色斑點，麻疹的紅疹最先出現在兩頰與耳後再擴及軀幹；立即給予個案口罩使用，並立即送醫後確診為麻疹病例。

處理步驟(以下內容統一向衛保組組長→學務長→校長報告)：

- 一、立即通報值班教官(本校 381119 或分機 1119)、衛生所李秋華醫檢師(271661)。
- 二、於 24 小時內建置個案及接觸者基本資料，完成「國立聯合大學健康管理與服務記錄表」填寫(如附件)，包括：
  - (一)至校務資訊系統 <http://www.nuu.edu.tw/UIPWeb/wSite/ct?xItem=124749&ctNode=10945&mp=2>，蒐集個案課表及同學名冊。
  - (二)電洽本校住宿服務中心(分機:1750)，瞭解個案住宿與否及同寢室學生資料。
  - (三)由新生體檢資料電子檔搜集學生及家長聯絡電話。
  - (四)電洽系辦公室蒐集導師及授課老師聯絡電話。
- 三、向學生、學生家長連繫病情診斷，給予醫療建議、衛教手冊及心理支持。
- 四、衛教學生於公眾場所請戴上口罩(空氣與飛沫傳染)、保持所處環境空氣通暢(空氣傳染)，寢室之桌面、門把、電源開關以一般市售的漂白水，以 100 倍的水稀釋來擦拭；麻疹的傳染期為出疹前後 4 日，請在家休養按醫囑服藥；出疹至少 4 天後即不具傳染力才可返回學校上課。
- 五、對同寢室、同班同學衛教內容如前項，請注意個案相關之實驗室、研究室以 100 倍稀釋的漂白水擦拭環境。
- 六、與導師、系主任、宿舍輔導員聯繫(遵守傳染病法第十條對病患隱私權的保護)。
- 七、協商總務處事務與採購組將個案上課之教室桌面以 100 倍稀釋的漂白水擦拭桌面。
- 八、以學務長為本校對外之單一窗口(新聞媒體與向校長報告)

衛保組持續追蹤學生病情  
至康復返校上課後結案

備 註：

- 1、接觸者處理：積極尋找接觸者(出疹前、後 4 天內)，因為若接觸麻疹病人後 72 小時內接種 MMR 疫苗，或 6 天內進行肌肉注射免疫球蛋白(intramuscular immunoglobulin, IMIg)，尚有可能預防麻疹發生。
- 2、麻疹的新發生個案多來自沒有接種麻疹疫苗的外籍婦女或是大陸台商的小孩，導致零星流行。
- 3、少數中壯年人未曾感染過麻疹，部分曾接種疫苗因隨年齡增長產生抗體衰減，如感染後仍具傳播力。建議民國 70 年以後出生之成人欲前往流行地區，可自費接種 MMR 疫苗，如為自然感染免疫者不需再施打疫苗。